令和８年 ３月　　野菜病害虫発生予察巡回調査月報 －露地 －

調査年月日	令和８年　　(2026年 3月9～16日)

作物名	作型	栽培面積 ha		病害虫名	総合概評	概評	発生面積 (ha)	発生ほ場率(%) 本年	発生ほ場率(%) 平年	発生程度別ほ場率（%） 甚	多	中	少	無	発生ほ場率（%） 16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	調査ほ場数	記事
キャベツ	春どり	566	精査	軟腐病	並	並	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	計 14	
				黒腐病	やや少	やや少	0	0	3					100	0	9	0	11	6	0	0	0	0	0	山川 4	
				菌核病	やや少	やや少	81	14	27				14	86	13	22	13	17	44	44	28	39	22	31	溝辺 －	大隅:少1, 串良:少1
				コナガ	少	少	0	0	9					100	8	9	13	22	17	11	6	0	0	6	大隅 6	
				ハスモンヨトウ	並	並	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	串良 4	
				シロイチモジヨトウ	並	並	0	0	0					100	－	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				オオタバコガ	並	並	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	内調査協力員	
				ヨトウガ	並	並	0	0	0					100	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	大隅 6	
				モンシロチョウ	やや少	やや少	0	0	2					100	0	0	0	6	11	6	0	0	0	0		
				チョウ目被害	やや多	やや多	283	50	34			29	21	50	－	－	－	－	61	67	0	33	33	13		山川:少1, 大隅:中1少2, 串良:中3
				アブラムシ類	多	多	81	14	2			7	7	86	4	9	0	0	0	0	6	0	0	0		山川:中1少1 発生種はﾓﾓｱｶｱﾌﾞﾗﾑｼ
			達観	モザイク病	－	並	0	0	0					100	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0		
				べと病	－	多	121	21	4				21	79	0	0	8	11	0	0	0	0	11	6		串良:3
				タバコガ	－	並	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				その他																						主な品種：天光２号，天光５号，おきなSP 生育時期：山川:結球初期 溝辺:収穫済 串良:結球初期～結球中期 大隅:本葉10枚～収穫期
エンドウ類	冬･春どり	479	精査	菌核病	やや少	やや少	0	0	6					100	－	－	－	－	－	5	15	10	0	0	計 16	
				褐紋病・褐斑病	並	並	269	56	58	6	6	13	31	44	83	50	67	58	75	50	35	70	25	69	山川 8	山川:甚1多1中2少4, 垂水:少1
				さび病	並	並	0	0	0					100	－	－	－	－	－	0	0	0	0	0	阿久根 4	
				○ うどんこ病	やや多	並	180	38	28		6		31	63	0	8	8	8	25	60	55	50	25	44	垂水 4	山川:多1少4, 垂水:少1
				ハスモンヨトウ	並	並	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				シロイチモジヨトウ	並	並	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				オオタバコガ	並	並	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	内調査協力員	
				ヨトウガ	並	並	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	山川 4	
				ハモグリバエ類	並	並	329	69	74		6		63	31	42	67	92	92	42	95	85	100	100	31		山川:少3, 阿久根:少4, 垂水:多1少3
				○ アザミウマ類	多	やや多	449	94	74	25	25	13	31	6	92	75	92	75	100	95	60	35	50	69		山川:甚3少4, 阿久根:多2中1少1, 垂水:甚1多2中1
			達観	立枯性病害	－	やや少	0	0	14					100	17	0	33	0	8	20	15	0	25	25		
				タバコガ	－	並	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				ウラナミシジミ	－	並	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				その他																						主な品種：まめこぞう, ｽｰﾊﾟｰｸﾞﾘｰﾝ 生育時期：収穫期

令和８年 ３月　　野菜病害虫発生予察巡回調査月報 －露地 －

調査年月日	令和８年　　(2026年 3月9～16日)

作物名	作型	栽培面積 ha		病害虫名	総合概評	概評	発生面積 (ha)	発生ほ場率 (%) 本年	平年	発生程度別ほ場率（%） 甚	多	中	少	無	発生ほ場率（%） 16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	調査ほ場数	記事
バレイショ（県本土）	春	1,352	精査	○ 疫病	やや少	やや少	0	0	10					100	38	21	0	11	22	6	0	0	0	0	計 18	
				菌核病	やや少	やや少	0	0	6					100	0	21	0	0	17	6	0	17	0	0	錦江 4	
				アブラムシ類	やや多	並	376	28	22		6		22	72	13	38	0	33	44	33	11	17	6	22	開聞 4 長島 4 出水 6	開聞:多1,錦江:少1,出水:少3 発生種はジャガイモヒゲナガアブラムシ，ワタアブラムシ
			達観	モザイク病	－	並	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				軟腐病	－	多	75	6	0				6	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	内調査協力員	錦江:1
				その他																					出水 6	錦江：一部ほ場で寒害による欠株が認められた 主な品種：ニシユタカ，オホーツクチップ 生育時期：錦江，開聞，長島;茎葉伸長期 出水;萌芽期～茎葉伸長期
バレイショ（熊毛）	春	187	精査	○ 疫病	並	並	－	50	45				50	50	100	14	17	50	67	67	33	33	50	17	計 2	西之表:少1
				菌核病	並	並	－	0	8					100	17	0	0	0	0	0	0	67	0	0	調査協力員のみ	
				アブラムシ類	並	並	－	0	2					100	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	西之表 2	
			達観	モザイク病	－	並	－	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				軟腐病	－	並	－	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				その他																						主な品種：ニシユタカ 生育時期：黄変期 ほとんどのほ場が収穫済みだったため，２ほ場のみ調査

注1)「概評」は，本年の発生ほ場率を過去10年間の平均値（平年値）から統計的に評価したものである。
注2)「総合概評」は，上記「概評」に発生程度を加味して，評価したものである。
注3)「達観」は発生が確認された場合，発生の有無のみの調査である。
注4)○：予報に掲載。