

茶樹 病害虫発生予察巡回調査月報

2026年(令和8年)3/9~18日調査

病害虫名	総合概評	概評	地域	発生面積 (ha)	発生ほ場率 (%)		発生程度 (%)				年次別 発生ほ場率 (%)							発病・発生数 (%、頭、枚)			備考													
					本年	平年	甚	多	中	少	無	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24		'25	本年	評価	平年									
赤焼病	-	-	南薩	285	6	-				6	94																1㎡当り 発症梢数	南薩	0.6	多	(0.0)	少: 頰娃(谷場) 1		
		-	北薩	0	0	-																							北薩	0.0	並		(0.0)	
		-	大隅	0	0	-																								大隅	0.0		並	(0.0)
		-	県計	285	4	-				4	96														3	0			県平均	0.3	多		(0.0)	
○チャノコカク モンハマキ	やや少	やや少	南薩	0	0	7					100	13	6	0	6	0	0	12	12	0	19					1㎡当り	南薩	0.0	やや少	(0.1)				
		やや少	北薩	0	0	4						100	0	10	0	10	0	0	0	0	10	10					虫数	北薩	0.0	やや少		(0.04)		
		並	大隅	0	0	5						100	0	0	0	0	0	13	0	0	0	38					大隅	0.0	並	(0.1)				
		やや少	県計	0	0	6						100	7	5	0	5	0	3	7	7	2	22					県平均	0.00	やや少	(0.1)				
○チャハマキ	やや少	やや少	南薩	285	6	15				6	94	6	13	44	6	13	12	12	6	18	25					1㎡当り	南薩	0.1	やや少	(0.5)	少: 知覧(後岳) 1			
		やや少	北薩	0	0	6						100	0	10	0	0	10	0	0	0	30	10					虫数	北薩	0.0	並		(0.1)		
		やや少	大隅	0	0	6						100	13	0	13	0	0	13	0	0	25	0					大隅	0.0	並	(0.1)				
		やや少	県計	285	4	11				4	96	7	9	28	4	9	10	7	3	22	16						県平均	0.0	やや少	(0.3)				
チャノミドリ ヒメヨコバイ	やや少	少	南薩	285	6	20				6	94	31	25	13	19	25	24	6	24	0	31					4ヶ所叩き	南薩	0.1	少	(0.2)	少: 知覧(後岳) 1, 出水 1, 錦江 2			
		並	北薩	147	10	12				10	90	0	20	0	10	20	20	10	20	10	10					落とし虫数	北薩	0.2	並	(0.2)				
		多	大隅	478	25	8				25	75	0	13	0	13	13	0	0	13	25	0						大隅	0.8	多	(0.1)				
		やや少	県計	911	11	15				11	89	18	21	7	16	21	17	5	20	8	20						県平均	0.3	やや多	(0.2)				
チャノキイロ アザミウマ	やや少	並	南薩	571	13	19				13	88	56	25	31	19	6	29	18	6	0	0					4ヶ所叩き	南薩	0.3	並	(0.7)	少: 知覧(菊永) 1, 知覧(後岳) 1, 鹿屋 1			
		やや少	北薩	0	0	18						100	40	10	50	0	30	40	0	0	10	0					落とし虫数	北薩	0.0	やや少		(0.6)		
		やや少	大隅	239	13	28				13	88	25	13	38	63	13	63	13	25	25	0							大隅	0.3	やや少		(1.5)		
		やや少	県計	810	10	21				10	90	45	19	36	26	12	39	13	9	8	0							県平均	0.2	やや少		(0.9)		
○カンザワハダニ	多	多	南薩	2,568	56	28				56	44	19	38	25	44	19	24	47	24	18	25					寄生葉率	南薩	1.7	並	(1.1)	多: 末吉 1 中: さつま 1, 出水 2, 溝辺 1, 牧園 1, 湧水 1, 末吉 1 少: 頰娃(谷場) 1・知覧(菊永) 2, 知覧(後岳) 2, 川辺 2, 加世田 1, 伊集院 1, さつま 1, 溝辺 1, 鹿屋 2, 錦江 2			
		多	北薩	1,472	100	68		10	70	20		70	70	50	70	80	50	70	80	80	60							北薩	15.8	多		(3.7)		
		やや少	大隅	956	50	68				50	50	25	100	63	88	63	75	63	63	63	75							大隅	2.8	並		(3.3)		
		多	県計	4,996	63	45		2	13	48	37	30	59	39	59	40	41	55	43	40	44							県平均	6.1	多		(2.4)		
ツマグロアオ カスミカメ	並	並	南薩	0	0	0					100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					1㎡当り	南薩	0.0	並	(0.0)				
		並	北薩	0	0	2						100	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0						被害芽数	北薩	0.0		並	(0.0)	
		並	大隅	0	0	0						100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						大隅	0.0	並		(0.0)		
		並	県計	0	0	0						100	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0						県平均	0.0	並		(0.0)		
チャトゲ コナジラミ	-	-	南薩	1,712	38	-			6	31	63	-	-	-	-	-	-	-	-	41	50					寄生葉率	南薩	1.4	-	-	中: 伊集院 1, さつま 2, 末吉 2 少: 頰娃(青戸) 1, 加世田 1, 枕崎 2, 伊集院 1, 溝辺 1, 牧園 1, 湧水 1, 有明(野井倉) 1, 鹿屋 1, 錦江 2			
		-	北薩	1,030	70	-			40	30	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	90						北薩	8.1	-		-		
		-	大隅	956	50	-			50	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	38						大隅	2.0	-		-		
		-	県計	3,698	47	-			11	36	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	54						県平均	3.5	-		-		

※その他特記事項

南薩: 薩摩中南部 4,565ha 8地点16ほ場 【南九州市頰娃町牧之内(谷場)②・頰娃町上別府(青戸)②・知覧町塩屋(菊永)②・知覧町郡(後岳)②・川辺町下山田(塘池)②】

北薩: 川内川中流域・霧島山麓 1,472ha 6地点 10ほ場 【南さつま市加世田内山田(東山)②、枕崎市別府(中原)②、日置市伊集院町古城(飯牟礼)②】

大隅: 大隅中南部 1,912ha 4地点 8ほ場 【さつま町船木(舟木)②、出水市平和町②、霧島市溝辺町麓(論地)②、霧島市牧園町三休堂①、湧水町木場①、曾於市末吉町岩崎②】

県計(鹿毛・大島除く) 7,949ha (R6) 18地点34ほ場 【志布志市有明町野井倉②・有明町原田②、鹿屋市東原町②、錦江町城元②】

※表中の「総合概評」は、「発生面積評価」に「発病・発生数(率)」や「発生程度」を加味したものである。